

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
 ET DE LA FORÊT

 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
 LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

 Bulletin Technique N° 170
 du 7 mai 1990

 Votre abonnement se terminera avec le
 prochain bulletin

 Vous trouverez ci joint un bulletin
 de réabonnement.

ARBRES FRUITIERS

** mouche de la cerise

Les premières captures ont été observées dès la fin avril en plaine (MARANA). Sur les variétés les plus précoces, inutile d'intervenir. Sur les autres variétés vous pouvez dès maintenant pulvériser un produit destiné à détruire des **adultes** = DECIS (deltaméthrine), ou attendre environ 8 jours et utiliser un larvicide que vous choisirez parmi les produits suivants :

Matière active	g/m.a /hl	Spécialités commerciales	Délai avant récolte
dimethoate	30	nombreuses spécialités	7 jours
formothion	50	ANTHIO-FORT	7 jours
malathion	100	MALIXOL L50 inodore, ZITHIOL liquide	7 jours
diazinon	30	BASUDINE	15 jours
fenthion	50	LEBAYCID	15 jours

** tordeuse orientale du pêcher

Les captures augmentent à nouveau et avec le réchauffement des températures une augmentation du vol et des pontes est probable. Intervenez dès maintenant avec :

- biphenthrine	3	g de m.a./hl	TALSTAR FLO
-deltaméthrine	1,75	g de m.a./hl	DECIS
-dichlorvos (*)	125	g de m.a./hl	Nombreuses spécialités
-esfenvalérate	1,5	g de m.a./hl	SUMI ALPHA
-fénitrothion	50	g de m.a./hl	Nombreuses spécialités
-fenpropathrin	10,5	g de m.a./hl	DANITOL
-fenvalérate	7,5	g de m.a./hl	SUMICIDIN 10
- fluvalinate	12,2	g de m.a./hl	KLARTAN
- méthidathion	40	g de m.a./hl	ULTRACIDE PM
- méthomyl (*)	75	g de m.a./hl	LANNATE, METOVER
- mévinphos (*)	50	g de m.a./hl	PHOSDRIN, PHOSLIT
- phosalone	60	g de m.a./hl	ZOLONE

(*) Produits à faible rémanence (3 à 5 jours)

 Imprimerie de la Station de CASAMOZZA
 Directeur - Gérant : J.C. COQUET

 Abonnement Annuel : à
 Régisseur de Recettes

 Publication Périodique
 CPPAP N° 1789 - AD

 ISSN
 C7 39 - 9633

P14

**** pucerons sur pêcheurs**

Les pucerons verts se multiplient activement, les colonies sont fréquemment abondantes.

Intervenez si nécessaire dès maintenant avec de préférence :

PIRIMOR, KLARTAN, KILVAL, ZOLONE.

**** rouille du prunier**

La protection est basée sur deux à trois interventions se situant début mai, début juin et éventuellement début juillet.

Dans les vergers régulièrement attaqués, un traitement est nécessaire dès à présent avec :

- manébe	à 160 g de m.a./hl	nombreuses spécialités
- mancozébe	à 160 g de m.a./hl	" "
- zinébe	à 200 g de m.a./hl	" "
- zirame	à 180 g de m.a./hl	" "

OLIVIERS

**** teigne de l'olivier**

Dans les vergers atteints, c'est le moment d'effectuer le traitement . Préférez

bacillus thuringensis	BACTOSPEINE
carbaryl	SEVIN
diéthoate	NS

AGRUMES

**** pucerons verts et noirs**

Un traitement ne s'avère nécessaire que si les jeunes pousses sont très envahies. Préférez le PIRIMOR.

VIGNE

**** mildiou**

Aucun autre foyer primaire n'a été observé. Les conditions météorologiques sont actuellement peu favorables à l'évolution de la maladie. Toutefois, le développement actuel de la végétation laisse supposer que la floraison est proche pour les cépages précoces. Une attaque de mildiou serait particulièrement redoutable en cette époque , il faut donc réaliser un traitement anti-mildiou sur ces cépages dès la semaine prochaine et poursuivre ce traitement progressivement sur les autres cépages.

**** oïdium**

Ajouter un anti-oïdium à la boullie anti-mildiou.

**** tordeuses de la grappe**

Le premier vol se termine. Peu de pontes, peu de glomérules, inutile de traiter sauf situations exceptionnelles.

**** acariens**

Toujours localisés, ils abondent dans cette parcelle. Effectuez un traitement acaricide si nécessaire.

=====